

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

2

DLP 21-5-79105297

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43 - 09.27.46

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN n° 13 - 18 MAI 1979

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F.

## V I G N E

Rot Brenner ou Rougeot parasitaire - Sauf en situations tardives où la végétation est encore trop peu importante prévoir dès maintenant un premier traitement.

Pyräle - Les sorties de pyräle ont débuté. Dans les zones sensibles, et plus particulièrement dans les blancs une première intervention se justifiera à partir du 21.

Vers de la grappe - Les vols de papillons ont débuté mais il est encore trop tôt pour intervenir.

Araignées rouges - Les éclosions ont commencé. Si les températures se relèvent un traitement se justifiera en fin de semaine dans les parcelles intéressées.

## ARBORICULTURE FRUITIERE

Tavelures du pommier et du poirier - D'importantes projections d'ascospores ont été enregistrées le 16 et 17 mai, au cours de pluies de faible importance ; il y a lieu de continuer la protection des vergers compte tenu de la "pousse" actuelle des arbres.

Araignées rouges : P. ulmi, à surveiller, en examinant les premières feuilles des bouquets foliaires. Attendre la fin floraison pour une intervention éventuelle qui pourrait se décider, si la présence d'acariens est constatée sur les feuilles les plus récentes sur les bois de 2 à 4 ans et si celles-ci grisailent. Tout traitement systématique est à proscrire.

Chenilles défoliatrices - Les poiriers confédération en particulier sont parfois très sensibles aux attaques sur fruits provoquées par la cheimatoïdie. Dans les vergers de pommiers où des dégâts d'Archips ont été constatés sur la récolte 1978, un traitement peut être nécessaire dès la fin floraison.

Pucerons : à surveiller, en particulier les premières colonies de Puceron cendré.

Le Chef de la Circonscription,

J. DELATTRE.